

Furesø oktober 2010

Information om børn med lungebetændelse

Det er ofte virus, der er årsag til lungebetændelse hos børn, men det kan også være en infektion med bakterier.

Viruslungebetændelse kan ikke behandles med antibiotika, men det kan lungebetændelse med bakterier.

Smitte:

Virus findes i slim og spyt hos det syge barn. Smitten sker gennem indånding af små dråber efter host og nys eller efter barnet har været i kontakt med hænder, legetøj osv., hvor der sidder slim og spyt. Infektion med bakterier skyldes oftest, at de bakterier, der normalt findes i svælget, kommer ned i lungerne og udvikler betændelse.

Symptomer:

Almindelige forkølelsessymptomer:

- Hoste.
- Vejrtrækningsbesvær med hurtig vejrtrækning.
- På grund af det øgede muskelarbejde kommer der indtrækning, der ses som fordybninger ved halsen og mellem og under ribbenene. Der kan ses øget brug af mavemuskler, slimraslen og evt. hvæsende stødende udånding.
- Feber, spædbørn får ikke altid feber.
- Evt. smerter i forbindelse med vejrtrækning og hoste.

Gode råd

- Giv barnet rigelig at drikke. Væske gør slimmen tyndere og dermed lettere at hoste op.
- Vær opmærksom på at barnet ikke har for meget tøj på, hvis det har feber.
- Hæv hovedgærdet på barnets seng, det vil lette barnets vejrtrækning. Husk også at skifte stilling på barnet. Det kan sove på begge sider, sidde op, bevæge sig og lege efter evne.
- Frisk luft. Luft gerne ud flere gang dagligt.
- Undgå passiv rygning, da det øger hyppighed af infektioner hos barnet.
- Giv ikke hostestillende medicin, da det kan medføre, at det seje slim ikke bliver hostet op.

Hvornår søger man læge?


Søg læge hvis barnet:

- Får høj feber samt hurtig, stødende og besværet vejrtrækning.
- Virker træt, slapt og ikke vil lege.
- Ikke vil drikke.
- Har dårlig kontakt til dig.
- Bekymrer dig og du bliver utryg.



FURESØ
KOMMUNE

www.furesoe.dk



Behandling:

- Giv smertestillende medicin efter aftale med læge.
- Antibiotika hvis lungebetændelsen skyldes bakterier.

Institution/dagpleje:

Dit Barn kan komme i institution, når det ikke har feber mere, og vejrtrækningen er normalt. Er der mulighed for, at barnet kan blive hjemme et par dage ekstra, er det fint, for de første par dage, har barnet større risiko for at blive smittet med andre sygdomme. Det gør også risikoen for at smitte andre børn mindre.